O formulário está condicionado ao estudo feito pelo aluno para a realização desta prova, servindo como uma forma de recordação aos conceitos aprendidos.

Prof. Serra

$$D_u f(P_0) = \text{grad} f(P_0) \cdot \vec{u} = \vec{\nabla} f \cdot \vec{u} \quad \text{com } |\vec{u}| = 1$$

Polares $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ $P_1 = r \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}$

Normal: $\frac{(x-x_0)}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{(y-y_0)}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{(z-z_0)}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$

O valor máximo de $D_u f$ ocorre quando $\vec{u}$ tem a direção de $\vec{\nabla} f$

Plano tangente: $F_x(x_0, y_0, z_0)(x-x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y-y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z-z_0) = 0$

INTEGRAIS IMEDIATAS

Sejam $\alpha \neq 0$ e k constantes reais. Das fórmulas de derivação seguem as seguintes de primitivação:

- $\int k dx = kx + c$
- $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (\alpha \neq -1)$
- $\int e^x dx = e^x + c$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$
- $\int \cos x dx = \text{sen} x + c$
- $\int \text{sen} x dx = -\cos x + c$
- $\int \sec^2 x dx = \text{tg} x + c$
- $\int \sec x \text{tg} x dx = \sec x + c$
- $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \text{tg} x| + c$
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \text{arctg} x + c$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \text{arcsen} x + c$

Integral dupla

1. Calcule as seguintes integrais:

- a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen} x \cdot \cos y dy dx$
- b) $\iint_D xy^2 dA$, D é limitada por $x = 0$ e $x = \sqrt{1-y^2}$
- c) $\int_0^4 \int_{\sqrt{x}}^2 \frac{1}{y^3+1} dy dx$

2. Calcular a integral $\int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 3e^{x^3} dx dy$

3. Dada a integral $\left[\int_0^1 \int_1^4 y \cdot \cos(x^2) dx dy + \int_1^2 \int_{y^2}^4 y \cdot \cos(x^2) dx dy \right]$. Pede-se:

- a) Esboçar a região de integração.
- b) Inverter o sentido de integração e calcular a integral.

4. Dada a função $f(x, y) = x \cdot e^{y^2}$ e sendo R a região do primeiro quadrante limitada pelas parábolas $y = x^2$ e $y = 4x^2$ e pela reta $y = 4$.

- a) Escreva a integral nas duas ordens de integração.
- b) Calcule a integral mais conveniente.

Coordenadas Polares

5. Calcule a seguinte integral utilizando coordenadas polares $\iint [\cos(\sqrt{x^2 + y^2})] dx dy$ na região definida por: $x^2 + y^2 \leq 9; x \geq 0; y \geq x$.
6. Seja K a região definida por: $(x - 3)^2 + y^2 \leq 9, x^2 + y^2 \geq 9, y \geq 0$
- a) Esboce a região K
- b) Calcule a integral $I = \iint_K \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$
7. Dada a região de integração: $D = \begin{cases} x^2 + (y - 2)^2 \leq 4 \\ y \leq x \end{cases}$ calcule a integral $I = \iint_D x dx dy$.
8. Utilizando a propriedade $\iint_{S \pm S'} f(x, y) dx dy = \iint_S f(x, y) dx dy \pm \iint_{S'} f(x, y) dx dy$, calcular a integral de $f(x, y) = x^2 y$ na fronteira $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1; x + y \leq 2 \\ x \geq 0; y \geq 0 \end{cases}$.
9. Calcule $I = \iint_R \sqrt{x^2 + y^2} dA$, sendo R a região entre a circunferência de raio 1 de centro no ponto $(0,1)$ e a circunferência de raio 2 com centro $(0,2)$ com $\frac{\sqrt{3}}{3}x \leq y \leq x$.

Exercícios complementares

10. Seja $I = \iint_D e^{x^3} dx$, com $D = \{x^2 \leq y \leq 4x^2, 0 \leq x \leq 1\}$. Pede-se:
- a) Escrever a integral dupla I com os respectivos extremos considerando a integração em x .
- b) Idem em y .
- c) Calcule a integral.
11. Dada a integral $\int_0^4 \int_x^2 \frac{1}{1+y^2} dy dx$, pede-se:
- a) Esboçar a região de integração
- b) Inverter o sentido de integração e escrever a integral com os respectivos extremos de integração;
- c) Determinar o resultado da integral
- 12.
- a) Escrever em coordenadas polares a equação da reta $y = x$ e da circunferência $(x - 2)^2 + y^2 \leq 4$.
- b) Seja $I = \iint_K dx dy$. Se K é o conjunto $\{(x - 2)^2 + y^2 \leq 4; y \geq x\}$, escrever a integral I com extremos em coordenadas polares. Dê uma interpretação geométrica para esta integral (não há a necessidade de desenvolvê-la).
- c) Calcular $\iint_B \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$ onde $B = \{(x - 2)^2 + y^2 \leq 4, 0 \leq y \leq x\}$.
13. Uma lâmina circular tem centro na origem e raio 2, com $y \geq 0$ tem densidade superficial de massa $\sigma = x + 2y^2$. Pede-se determinar a massa da lâmina.